

全球海洋监测预测简报

(第 86 期)

2023 年 08 月 28 日



国家气候中心

一、近期海洋监测特征

2023 年 7 月，赤道太平洋大部海表温度 (SST) 较常年同期偏高，东太平洋暖水中心偏高 2.0°C 以上 (图 1)。Niño3.4 区海温指数为 1.11°C ，较上月上升 0.18°C (图 2)，最近 3 个月 (5~7 月) 指数滑动平均值为 0.84°C 。北太平洋中纬度大部 and 南太平洋西南海域 SST 较常年同期明显偏高，其中北太平洋暖中心距平值在 2.0°C 以上。




图 1 2023 年 7 月海表温度距平分布图 ($^{\circ}\text{C}$)




图2 Niño3.4区海温指数(°C)和SOI指数逐月演变

7月,热带印度洋大部分地区 SST 为正距平(图1),热带印度洋全区一致海温模态指数为 0.33°C;热带印度洋海温偶极子指数为 0.29°C;南印度洋偶极子指数为 0.44°C。北大西洋中纬度西部海温偏高显著,其中正距平中心高于 2°C,北大西洋三极子(定义为固定区域海温距平差)指数为-2.11°C。

7月,赤道太平洋次表层 150m 以上大部均为异常暖水控制,暖中心主要位于东太平洋次表层 50-100m 之间,中心强度高于 4°C;赤道太平洋 140°W 以西 150m 以下次表层主要为异常冷水,冷中心位于 150°W 附近 100-150m 之间,中心强度低于-2°C;赤道印度洋温次表层 70m 以上为暖水控制,70m 以下为异常冷水,冷中心强度低于-2.0°C(图3左)。与上月相比,赤道东太平洋次表层约 100 深度附近的暖水显著增强,而中、西太平洋 100-200m 之间的次表层海水明显变冷;赤道印度洋西部海水明显升温,升温中心在 50-100m 之间,东部海水明显降温,降温中心在 100-150m 之间(图3右)。




图3 2023年7月赤道印度洋-太平洋次表层海温距平深度-经度剖面(左)

及其与上月差值分布（右）（°C）

二、热带大气特征

2023年7月，南方涛动指数（SOI）为-0.52（图2），较上月下降0.82。赤道太平洋大部对流活跃（图4）。




图4 2023年7月平均射出长波辐射（OLR）距平图（W/m²）

7月，沿赤道（5°S-5°N 平均）的垂直纬向环流距平场上，热带西太平洋至日界线附近上空为异常上升运动显著，赤道东印度洋上空对流层上升运动增强，赤道西印度洋上空对流层为异常下沉运动（图5）。




图5 2023年7月赤道(5°S-5°N)平均垂直高度-经度环流距平剖面图
(阴影区表示垂直速度距平, 单位 0.01Pa/s)

7月, 赤道东太平洋对流层高层(200hPa)主要受西风距平控制, 低层(850hPa)主要受东风距平控制; 赤道西太平洋对流层高层(200hPa)主要受东风距平控制, 低层(850hPa)主要受西风距平控制(图6)。




图6 赤道(5°S-5°N)平均200hPa(左)和850hPa(右)纬向风距平逐日演变(m/s)


三、各海区主模态趋势预测

监测表明, 目前赤道中东太平洋已进入厄尔尼诺状态。根据国内外动力气候模式和统计方法预测, 预计未来三个月赤道中东太平洋海温持续上升, 将于今年秋季形成一次中等强度的东部型厄尔尼诺事件, 峰值可能出现在今年10-12月期间。预计未来三个月,

热带印度洋海温一致模为正位相，热带印度洋偶极子为正位相，副热带南印度洋偶极子为负位相；北大西洋三极子为负位相。

附录：国家气候中心关于厄尔尼诺（拉尼娜）事件的判识标准

Niño3.4 指数 3 个月滑动平均的绝对值（保留一位小数，下同）达到或超过 0.5°C 、且持续至少 5 个月，判定为一次厄尔尼诺/拉尼娜事件（Niño3.4 指数 $\geq 0.5^{\circ}\text{C}$ 为厄尔尼诺事件；Niño3.4 指数 $\leq -0.5^{\circ}\text{C}$ 为拉尼娜事件）。



赤道太平洋海温监测区分布图

2022 年 1 月开始，采用 1991-2020 年的 30 年平均作为气候态。

主 班：韩荣青

中国气象局 国家气候中心

地 址：北京市海淀区中关村南大街 46 号

签 发：顾薇

E-mail: predict@cma.gov.cn

邮 编：100081